

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

АЧС, африканская лихорадка, болезнь Монтгомери — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней всех пород и возрастов.

Для человека АЧС опасности не представляет, а для свиноводства последствия могут быть катастрофическими — поголовная гибель свиней.

Источник возбудителя инфекции — больные и переболевшие животные. Фактором передачи вируса служат корма, подстилка, навоз, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, продуктами убоя свиней и др.

Механическими переносчиками вируса могут быть хищные птицы, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые-паразиты (некоторые виды клещей, мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.

Заражение происходит респираторным путем через слизистые оболочки, поврежденную кожу. Вирус очень устойчив во внешней среде: при комнатной температуре сохраняется до 3 месяцев, в замороженном мясе — от 2 до 4 месяцев.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Инкубационный период заболевания продолжается 2—6 суток, болезнь протекает молниеносно, остро и реже хронически.

В **первом** случае животные гибнут внезапно, без выраженных патологоанатомических признаков. У них резко повышается температура тела, учащается пульс и дыхание.

Во **втором** — также повышается температура тела до 42,5°C, отмечается лихорадка, животные угнетены, одышка, кашель, появляются приступы рвоты, нервные расстройства (судороги, паралич конечностей). Наблюдаются серозные или серозно-гнойные выделения из носа и глаз.

На коже живота, у основания ушей, конечностей, промежности возникают различных размеров и форм геморрагические участки (резко выражен цианоз кожи). Супоросные свиноматки, как правило, абортируют. Длительность болезни 4—10 дней и обычно заканчивается летально.

В **третьем** — форма, осложненная секундарной микрофлорой, преимущественно у взрослых свиней, протекает с теми же симптомами, что и острое, но их развитие и проявление длительное и слабее выражено. В течение 6—8 дней удерживается высокая температура.

У большинства свиней наблюдаются признаки пневмонии, плеврит, перикардит, истощение. Через 15—25 дней больные погибают, а у выживших животных болезнь приобретает хроническое течение или вирусоносительство.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней не разработано, лечение не предусмотрено.

В случае возникновения очага инфекции всех находящихся в нем свиней уничтожают безкровным методом, с последующим сжиганием.

На неблагополучное по АЧС хозяйство или населенный пункт накладывают **КАРАНТИН**.

Ввоз на ферму новых свиней допускается только через год после ликвидации болезни.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ!

- обеспечьте безвыгульное содержание свиней;
- исключите использование в кормлении свиней непроверенных боенских и пищевых отходов;
- предоставляйте поголовье свиней для проводимых ветеринарной службой профилактических прививок и обработок;
- не завозите и не покупайте живых свиней, продукты их убоя, фуражное зерно и другие корма для животных без ветеринарных документов и из мест, неблагополучных по заболеванию АЧС.
- В целях снижения экономического ущерба, причиняемого данным заболеванием, рекомендуется перепрофилирование личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств на альтернативные свиноводству направления в животноводстве (скотоводство, овцеводство и птицеводство).

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПОДОЗРЕНИЯ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЕЙ АЧС ИЛИ ИХ ПАДЕЖА НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ.

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60, тел./факс: 27-59-04, e-mail: dv@admlr.lipetsk.ru